



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZIRLIYI
AQRAR ELM VƏ İNNOVASIYA MƏRKƏZİ
ƏKİNÇİLİK ELMI-TƏDQIQAT İNSTITUTU

*Dənli və dənlipaxlalı bitkilərin aqrotexniki
qulluq işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə
yetirilməsi və təhlükəsiz qaydalarına əməl
olunması*

b.ü.f.d.dosent: Sevdə Ağaməli qızı Abdulbaqiyeva

06 aprel 2021-ci il

Taxılçılıq kənd təsərrüfatı sektorunun aparıcı sahələrindəndir.

Taxıl əkinlərindən yüksək və keyfiyyətli məhsul almaq üçün ilk növbədə zəruri aqrotexniki tədbirlər planı ardıcıl həyata keçirilməli, yüksək məhsuldarlığı və dən keyfiyyətini şərtləndirən amillərin rolu müəyyənləşdirilməlidir.

Buğda bütün dünyada becərilən ən geniş yayılmış taxıl bitkisidir

Məhsul istehsalının artımı əkin sahələri hesabına deyil, məhsuldarlığın artırılması hesabına olarsa bu həm idxalın əvəzlənməsinə, həm də ixracın artmasına səbəb olar.

DƏNLİ BİTKİLƏRİN İNKİŞAFINA VƏ MƏHSULDARLIĞINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR

I QRUP

NİZAMLANMAYAN AMİLLƏR



- **İllik yağmurların miqdarı**
- **Dolu**
- **İllik fəal temperaturların cəmi**
- **Küləyin sürəti**

II QRUP

NİZAMLANAN AMİLLƏR



- **Torpağın becərilməsi**
- **Keyfiyyətli toxum**
- **Səpin müddəti**
- **Səpin norması**
- **Gübrələrin verilməsi**
- **Alaqlarla mübarizə**
- **Yaşıl malanın çəkilməsi**
- **Suvarma**
- **Xəstəlik və zərərvericilərlə mübarizə**
- **Yığımın vaxtında və keyfiyyətlə başa çatdırılması və s.**

Əkin sahələrində səpin qabağı tədbirlər

- Səpinə qədər görülməli işlər:

a) Sahənin sələf qalıqlarından təmizlənməsi və ya doğranıb sahəyə səpilməsi;

b) Sələfdən asılı olaraq şum və ya 8-12 sm yumşaltma, diskləmə və malalama;

- Toxum və gübrə tədarüku;

- Səpinin həyata keçirilməsi.

Diskiləmə və şumun aparılması



Ağır diskli mala



Dişli mala



Toxumun tədarük edilməsi

- 1. Bölgənin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun sort seçilməlidir;**
- 2. Mənşəyi məlum olan, tam təmizlənmiş, kondisiyaya çatdırılmış, sertifikatlı toxum istifadə edilməlidir;**
- 3. Toxumun sürmə və digər göbələk xəstəliklərinə qarşı müvafiq fungusidlərlə işlənməsi mütləqdir.**

Əkinçilik ET İnstitutunun rayonlaşmış taxıl sortlarının bölgələr üzrə yerləşdirilməsi

Tövsiyə edilən bölgələr	Rayonlaşmış sortlar		
	yumşaq buğda	bərk buğda	arpa
Suvarma	Əzəmətli 95, Qobustan, Murov 2, Qırmızı gül 1, Aran, Tale 38, Zirvə 85, Fatimə, Şəfəq 2, Pərvin, Əsgəran, Xəzri	Bərəkətli 95, Qarabağ	Qarabağ 22, Qarabağ 33, Cəlilabad 19, Sadiq
Nəmliklə tam təmin edilmiş dəmyə	Aran, Qızıl buğda	-	Qarabağ 22, Qarabağ 33, Nuranə
Nəmliklə qismən təmin edilmiş dəmyə	Aran, Ağalı, Ləyaqətli 80	-	Cəlilabad 19
Nəmliklə təmin olunmamış dağlıq dəmyə	Qobustan, Aran, Qızıl buğda, Ləyaqətli 80	-	Cəlilabad 19, Qüdrətli 48, Dəyanətli
Nəmliklə təmin olunmamış quraq dəmyə	Qobustan, Əzəmətli 95, Günəşli, Ləyaqətli 80, Gilavar	Bərəkətli 95, Qarabağ	Cəlilabad 19, Dəyanətli


Toxum səpən



Gübrə normaları və istifadəsi

1. Torpağın aqrokimyəvi tərkibindən asılı olaraq səpinə qədər şum altına üzvi (10-20 ton) və mineral P (300-400 kq f.ç.), K (100-120 kq f.ç.) gübrələrin verilməsi;
2. Səpinlə birlikdə kompleks mineral gübrələrin verilməsi (Amofos və ya Nitroamofoska 100-150kq f.ç.);
3. Kompleks mineral gübrələrlə ümumi azotun 15-20%-nin verilməsinin təmin edilməsi.

İllik azot gübrəsi normalarının verilmə müddətləri



Gübrə normalarının müəyyənləşdirilməsi üçün bitkinin torpaqdan və gübrədən qida maddələrini mənimsəmə əmsali müəyyənləşdirilməlidir.

Misal: Payızlıq buğdanın torpaqdan və gübrədən qida maddələrini mənimsəmə əmsali

Qida maddələrinin adı	Azot (N)	Fosfor (P_2O_5)	Kalium (K_2O)
Torpaqdan	25-35%	60-75%	8-22%
Gübrədən	55-75%	45-55%	70-80%

Bir sentner dən məhsulunun əmələ gəlməsinə qida sərfi kq-la

Azot (N)	Fosfor (P_2O_5)	Kalium (K_2O)
2,9-3,2	0,9-1,1	2,8-3,1

Suvarmanın vaxtı

Vegetasiya suvarmaları əsasən torpaqda normal nəmlikdən (70-80%) aşağı düşdükdə həyata keçirilir. Respublikamızda suvarma mövsüm ərzində aşağıdakı fazalarda həyata keçirilir.

1. Kollanma fazası
2. Boruya çıxma fazası
3. Süd yetişkənliyi fazası

Qış və ilkin yaz aylarında görülmə tədbirlər

1. Gəmiricilərə qarşı mübarizə işlərinin təşkili
2. Alaqalara qarşı kimyəfi mübarizənin aparılması
3. Kollanma fazasında azotla birinci yemlənmənin verilməsi

Клас: Мәмәлilər; Дәстә: Гәмиріціләр
Фәсилә:Сиңанабәнзәр; Нөв: Аdı çöl сиңanı

Ölçüsü – 7-12 см

Нәсillәр sayı– 12


Qışlama yeri – torpağın altında yuvalarda

Ağız aparatının tipi– gәmirici.

Zәdәlәmә tipi– payızlıq buğda cücәrtilәri, bitkinin yerüstü hissәsini vә dәni yeyir



Bitki xəstəliklərinin təsnifatı



Makro və mikro elementlərin çatışmazlığı



Buğdanın sarı pası – *Puccinia striiformis* West.









Buğdanın qonur pası -*Puccinia recondita*
Rob. ex Desm. f. tritici



Buğdanın zolaqlı və ya gövdə pası- *Puccinia graminis* Pers. f. *tritici* Eriks. et Nemn.



Buğdanın bərk və ya iylənən sürməsi – *Tilletia caries* (DC.) Tul., *Tilletia laevis* Kuehn.



**Buğdanın toz sürməsi– *Ustilago tritici*
(Pers.) Rostr.**





Helminthosporium turcicum




Fusarium moniliforme Scheld.
Fusarium Ear Rot



Helminthosporium maydis Y. Nisik. & C.
Miyake



Fusarium graminearum






***Sorosporium reilianum* (Kuehn)
McAlp.**



***Ustilago zeae* (Link) Unger
(*Ustilago maydis*
(DC.) Corda).**





Taxıl bitkilərinin ziyanvericiləri

- Taxıl böcəyi (Taxıl hafı).
- Taxıl milçəkləri (İsveç milçəyi, Yaşıl göz milçək və s.
- Zəlicə böcəyi.
- Adi taxıl mənənəsi
- *Taxıl yarpaqbükəni*
- Taxıl gövdə mişarçısı.
- Buğda tripsi.
- Sümürtgən taxıl böcəkləri.
- Ziyankar bağacıq.
- Cırcıramalar
- Şıqqıldaq böcəyinin sürfələri (məftil qurdu)

Tərtər BTS-nin Taxıl əkinlərinə ziyan vuran zərərvericilərdən biri **Zəlicə böcəyi** (*Lema melanopus* L.) - Taxıllar fəsiləsinin (Gramineae) bitkiləri ilə qidalanan *oliqofaq* həşəratdır.



Tərtər BTS, buğda sahəsi 16 may 2015
Zəlicə böcəyi

Tərtər BTS-nin Taxıl əkinlərinə ziyan vuran zərərvericilərdən biri **Zəlicə böcəyi** (*Lema melanopus* L.) - Taxıllar fəsiləsinin (Gramineae) bitkiləri ilə qidalanan *oliqofaq* həşəratdır.

Tərtər BTS, buğda sahəsi 16 may 2015
Zəlicə böcəyi




***Zəlicə böcəyinin
sürfələri ilə
Zədələnmiş
buğda bitkisinin
yarpaqları***



M n n  il  yoluxmu  S nb ll r; Qanadlı v  qanadsız formalar
Ab eron YTT 01 iyun 2015



Ziyankar bağazığın yetkin fərdləri_imaqo Tərtər BTS, buğda sahəsi 16 may 2015



- *İmazonun ölçüsü– uzunluğu 9-13 mm, eni 6-7 mm*
Sürfənin tipi– imazoyabənzər
Nəsillər sayı– 1
Qışlama fazası və yeri – meşə zolağında xəzəllərin altında
Zərərverən faza– sürfə, imazo
Ağız aparatının tipi – imazo, sürfə–deşici-sorucu;
Zədələmə tipi– yetişməmiş dən və sünbül pulcuqlarından bitki şirəsini sorur

Ziyankar bağacıqla sünbülün zədələnməsi
Qobustan və Bezostaya-1 sortları



Sort: Qobustan; Zədəli dənələr



Sort: Qobustan ; Sağlam dənələr



Taxil Böcəyi

İmazonun ölçüsü– 12-16 mm, sürfə– də 28 mm

Sürfənin tipi– kompodioşəkilli,

Nəsillər sayı– 1

**Qışlama fazası və yeri – müxtəlif yaşlı
sürfələr torpağın 20-40 sm dərinliyində**

Zərərverən faza– sürfə, imazo

**Ağız aparatının tipi– imazo,sürfə– gəmirici;
Zədələmə tipi–**

Sürfə



Taxıl böcəyini sürfələri ilə Zədələnmiş buğda sahəsi



Alaqlar və onlara qarşı mübarizə

Alaqlar mədəni bitkilərin məhsuldarlığını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri olmaqla

1. Əkin sahəsində su və qida maddələrini mənimsəyir
2. Sıxlıq yaradaraq xəstəlik və zərərvericilərin inkişafına münbitm şərait yaradır
3. Mədəni bitkiləri günəç işığından məhrum edərək normal fizioloji proseslərin gedişinə mənfi təsir edir.
4. Toplanan məhsulun zibillik faizini yüksəldir

Bülbülotu

Yabanı vələmir

Çoxillik qaramuq





BİTKİ XƏSTƏLİKLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ ÜSULLARI

Yüksək aqrotexnika- torpağın becərilməsi, növbəli əkin sisteminə əməl edilməsi, toxumların təmizlənməsi, səpinin optimal müddətlərdə aparılması, gübrə normalarının düzgün tətbiqi, davamlı sortlardan istifadə edilməsi, əlaq otları ilə mübarizənin aparılması və məhsulun optimal dövrdə yığılması.

Bioloji mübarizə- Xeyirli mikroorqanizmlərin, torpaq humusunun mikroflorasının və bütövlükdə biosferanın qorunmasında bioloji mübarizə tədbirləri yeganə vasitə hesab edilir.

Kimyəvi mübarizə- bütün xəstəliklər üçün istifadə edilən dərman preparatları mis tərkibli funqisidlər olması məsləhətdir.

Mis sulfat, mis xlorooks



Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

BİTKİLƏRİ QORUMAQLA İNSANLARI VƏ TƏBİƏTİMİZİ QORUYAQ

Bütün bitkilər kimi pambıq bitkisinin də becərilməsi zamanı zərərli orqanizmlərə qarşı kimyəvi mübarizə vasitəsi kimi müxtəlif pestisidlər tətbiq edilir. Lakin bu mübarizə tədbirləri yalnız zərərvericilər iqtisadi ziyanvurma həddini keçdiyi halda tətbiq edilməlidir.

Nəzərə almalıyıq ki, pestisidlər zəhərli kimyəvi maddələrdir. Buna görə də pestisidlərdən istifadə zamanı müvafiq təlimatlara ciddi riayət edilməlidir.

Pestisidlərin tətbiqindən sonrakı təhlükəsizlik tədbirləri

- ◀ Pestisidlərin tətbiq edildiyi sahələrə insanların və ev heyvanlarının **buraxılması müddəti hər bir pestisid üzrə spesifik təlimatlara uyğun müəyyən edilir**. Bu müddətlərə məcburi qaydada əməl olunmalıdır!
- ◀ İş başa çatdıqdan sonra mühafizə vasitələrini zərərsizləşdirmək üçün 1 litr suya 25 qr sabun və 5 qr soda tökərək hazırlanmış məhlul ilə mühafizə vasitələri yuyulmalıdır.
- ◀ Pestisid işlədildikdən sonra boşaldılmış qabları su mənbələrinə və yaşayış yerlərinə yaxın sahələrə atmaq qadağandır. Boş qablar zərərsizləşdirilməli və ya torpağa basdırılmalıdır.
- ◀ Araq otlarına qarşı pestisid vurulmuş sahənin ətrafında heyvanların otarılmasına və ya otun biçilib yem kimi üçün verilməsinə 30 gündən sonra icazə verilir.

Pestisidlərin mənfi təsirlərinin qarşısının alınması tədbirləri

Düzgün tətbiq edilmədiyi hallarda pestisidlər insan sağlamlığı üçün təhlükə yaradır, zəhərlənmə halı baş verə bilər.

Zəhərlənmənin simptomları:

Fəallığın zəifləməsi, tənənfəslik, göz bəbəklərinin genişlənməsi, əzələlərin titrəməsi, müvazinətin pozulması halları müşahidə oluna bilər.

İlkin yardım:

Pestisid dəriyə düşdükdə: Dərmanlı paltarlar çıxarılmalı, dəri sabunla təmiz yuyulmalıdır.

Pestisid gözə düşdükdə: Dərhal təmiz su ilə 15 dəqiqə müddətində yuyulmalıdır.

Tənəffüsün pozulması halında: zərərçəkmiş yaxşı havalandıran yeri apararaq təmiz hava ilə təmin etməli və ehtiyac olarsa süni nəfəs vermək lazımdır. Yuxarı tənəffüs yollarının qıcıqlanması zamanı boğazı 2%-li ilıq çay sodası məhlulu ilə qarqara etmək lazımdır.

Zəhərlənmə zamanı: Pestisidlər mədə-bağırsaq traktı vasitəsilə orqanizmə daxil olduqda zəhərlənmiş şəxsi təcili ərazidən çıxarmaq, duzlu su içirdərək mədəni yumaq və həkimə aparmaq lazımdır.

Pestisidlərlə zəhərlənmənin bütün hallarında zərərçəkən tibb müəssisəsinə çatdırılmalı və ya həkim çağırılmalıdır. İmkan daxilində zərərçəkənin özündə və ya onu müşayiət edən şəxsdə zəhərlənməyə səbəb olan preparatın etiketi və ya tətbiq edilməsinə dair təlimat olmalıdır.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əlaqə vasitələri:

Çağrı Mərkəzi: 1652

Telefon: (012) 498-08-44, 498-21-59,

Elektron poçt: web@agro.gov.az; www.agro.gov.az

Ünvan: AZ1000, Bakı, Səbail, Üzeyir Hacıbəyov, 80

Risklər

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları aqrar sığorta predmetləri üzrə aşağıdakı risklərin bir və yaxud bir neçəsindən sığorta qaydalarına əsasən sığortalanır:

- 1. Təbiət hadisələri, o cümlədən təbii fəlakətlər;**
- 2. Yanğın;**
- 3. Qəzalar;**
- 4. Yoluxucu xəstəliklər və zəhərlənmələr;**
- 5. Vəhşi heyvanları hücumu və xüsusi təhlükəli ziyanvericilərin yayılması və hücumu;**
- 6. Üçüncü şəxslərin hərəkətləri.**

**Diqqətinizə görə təşəkkür
edirəm!**

